

VIRIS ILLUSTRISSIMIS,
OMNIUM ORDINUM
ORNATISSIMIS,
PIETATE, JUSTITIA, PATRIÆ AMORE, SAPIENTIA,
SUMMO IN ÆGROTANTES STUDIO
SPECTATISSIMIS,
MAGNI NOSOCOMII PARISIENSIS
GUBERNATORIBUS VIGILANTISSIMIS,
QUORUM TUTELAM ET BENIGNITATEM
PER ANNOS OCTODECIM EXPERTUS,
HAS SUORUM LABORUM PRIMITIAS
IN ÆTERNUM GRATI ANIMI MONUMENTUM
VOVET, DICAT ET CONSECRAT

OBSEQUENTISSIMUS
J. P. LE ROUGE.

VIRIS ILLUSTRATISSIMIS

OMNIBUS ORDINIBUS

ORNATISSIMIS

INSTITUTIS PATRIAE AMORE

SUMMO IN AGROSTATES STUDIO

SPECTATISSIMIS

MAGNI NOBIS COMITI PARISIENSIS

SEBASTIANUS VITALENTIUS

QUONIAM TALEM ET BENIGNITATEM

PER VITAE OCTODECIM EXPERIUS

HABERE QUOD LABORUM PRIMITIAS


IN ETERNUM GRATI ANIMI MONUMENTUM

VOVIT, DICAT ET CONSERVAT

ORSEMENTISSIMUS

J. F. LE ROUGE

UNIVERSITY OF CHICAGO



DISSERTATIO ANATOMICO-CHIRURGICA

D E PERFECTA INGUINALIS HERNIÆ SIMPLICIS CURATIONE.

§. I.

IN abdomine, amplissimâ humani corporis cavitate, varia continentur viscera quæ præsertim digestioni, secretionibus & generationi dicantur; quò magis ad vitam necessaria, eò, si lædantur, imminentius instat periculum; hinc gravissimæ judicantur Herniæ. Infantes lacrymis & vagitibus, juvenes duris laboribus, senes inter vitæ tædia, fœminæ graviditatis

& parturitionis inter dolores, miseri perpetuâ defatigatione obrupti, divitesque molli otio languentes, huic teterrimo morbo obnoxii sunt; cui sanando insudârunt ex omni ævo artis periti. Sed, proh dolor! lento pede ars incedit. Quotidiè videntur agyræ, auri fame pressi, scientiæ vacui, ægorum fiduciam eludere, illos miris modis dilacerare, & aliquando, horresco referens, nefariis & lethalibus armis lacessere. Immortales claruerunt Auctores quorum vestigia si premantur, munitissima ad hernias curandas via aperietur. Felices! nimium felices! si tantis operibus aliquid in posterum addere nobis datur.

§. I I.

TUMOR, à prolapsu partium in abdomine contentarum, efformatus, Hernia vocatur.

Differunt à se Herniæ, ratione loci, partium in tumore contentarum, causæ, accidentium, &c.

De inguinali tantum Herniâ simplici tum completâ, tum incompletâ, ut pote frequentiori, differere animus est; quæ *Enterocèle*, quando intestina tumorem efficiunt; quando omentum, *Epiplocele*; dum utraque, *Enteroepiplocele* dicitur.

Omnes Herniæ in inguine ortæ, generatim inguinales nominantur; distinguuntur ex aperturâ, in annulares & in crurales. Si tantum inguen Herniâ intumescat, *bubonocèle*, si scrotum simul *oscheocèle*, vocatur tumor.

Ut autem ad propositum deveniamus, quædam de Anatomia loci & naturâ morbi sunt præmittenda.

§. I I I.

E X A N A T O M I A.

IN utroque inguine duæ reperiuntur naturales aperturæ,

irrumptentibus internis partibus, exitum præbentes, annulus, scilicet, & arcus cruralis.

§. I V.

Ex diductione duorum limborum in quos, sesqui-pollice priusquam in pubem desinat, dividitur musculi externi aponevrosi, annulus oritur, obliquè situs patentior suprâ, angustior infrâ, per quem in viris, vasa spermatica, musculusque cremaster, unâ cum cellulari textu, improprie funiculi tunica vaginalis dicto, educuntur; dùm in fœminis ligamentum rotundum, suo pariter cellulari textu concomitante, transeat.

§. V.

Arcus cruralis fit ejusdem aponevrosi orâ inferiori, quæ suâ duplicatione intus aucta, ligamentum mentitur, variis ab auctoribus nuncupatum *ligamentum inguinale*, *Fallopîi*, *Poupartii*, atque *Vesalii*, licet de illo Vesalius taceat. De utroque ligamento sic alloquitur Morgagnius: « Evidentissimè comperi, ipsa non » peculiaris ligamenta, sed unam tendinis ejusdem (obliqui » externi) musculi oram esse (1). Hocce pseudo-ligamentum à superiore illi ossis spinâ ad pubem extensum; nullam, nisi cum fasciâ latâ, mediantibus fibris aponevroticis firmioribus, connexionem habet; liberumque commeatum, à suâ parte posticâ, quasi fornicatum, arteriæ, venæ, nervo crurali, tendinibusque musculorum psoæ & iliaci præstat, arcumque cruralem efformat.

(1) Advers. III. pag. 2.

Fibrarum aponevroticarum , telæ cellularis, aliarumque partium circumstantium , implicatione clauduntur arcus sicut & annulus. Tam mirabilis fabrica impedit quominus partes in abdomine quasi liberæ & sæpè sæpius vehementer impulsæ faciliùs devolvant, cùm in homine stante, sedente, aut progrediente in inguen delabantur , ibique partes inferiores superiorum mole nimium premantur. Insuper inguen indefinenter liquore seroso ac pingui, quem glandulæ, vasa, necnon cellularis textus exsudant, nillibutum, facillè diducitur vel laxatur : inde frequentior inguinalis Hernia.

§. VI.

PERITONÆUM transversis musculis adhæret, sed laxius in inguine quàm in umbilico ; media quippè substantia eò cellulosior & spongiosior est, quò fit inguine vicinior. Unde, si cedant aperturarum oræ, maximè extenditur : indeque illius processus, nimirum *sacculus Herniosus*, qui prolapsa ambit ac continet.

§. VII.

DE glandulis, vasis, telæque cellulari inguinis, superiùs dicta, sufficiant.

§. VIII.

INVOLUCRA inguinum lævia, gracilia, partimque pilosa,

oleoso quodam humore continuò , ut jam diximus , madafacta , facillimè distenduntur.

§. I X.

E X P A T H O L O G I A .

PATENTIORES apertura §. III , debiliores , ipsarum oræ partes dimotæ & elongatæ cutisque ultra modum extensa , morbum constituunt.

§. X.

HERNIARUM causæ à pravâ partium dispositione & à nisu quocumque , partes contentas propellente , aperturasque distendente , desumuntur. Genuina igitur causarum divisio , in disponentes & determinantes.

§. X I.

CAUSÆ disponentes sunt naturales & acquisitæ.

Priores sæpè hæreditarias ab oris aperturarum § III. debilioribus , aut à situ ossium iliorum antrorsum decliviori , pendere constat.

Acquisitæ verò potissimum ex otiosâ , molli sedentariâque vitâ , habitatione in humidis , victu potuque aquoso , lacteo & pingui , oriuntur : idcirco quorundam ordinum Monachis hoc malum adeò frequens. Celeb. Gunzius in suo libello de Herniis , eâ de re , sic alloquitur : *in Monachis crediderim verisimilem magis causam hanc esse , quod sæpè in genua procumbere coguntur , in quo positu annuli musculorum abdominis pressioni intestinorum quàm maximè expositi sunt.*

Hujusce speciei causæ sunt etiam gestatio, parrus, hydrops, &c.

§. XII.

NISUS omnes qui musculorum abdominalium contractionem nimium intendunt, accipiantur ut causæ determinantes: accidunt vociferatione, facibus alvi nimium induratis expellendis, laborioso partu, vomitu, tussi, ponderibus gravioribus attollendis, cursu, saltu, equitatione, tuborum insufflatione, &c. &c.

§. XIII.

INTER causas Herniarum adhuc annumerantur peritonæi dilatatio & ruptura. Prior autem potius est effectus; non extenditur enim peritonæum quin annuli columnæ §. IV, aut inguinale pseudo-ligamentum §. V, viscerum impulsui & ponderi cedant. Posterior, nimirum ruptura, licet à plurimis admissa, jure negatur; dissectione enim sollicitè inquisita nunquam apparuit. Hoc tantummodò fieri potest, per accidens, si Hernia vehementer percussa fuerit (1).

§. XIV.

Herniarum simplicium diagnosi.

AD perfectam Herniarum inguinalium diagnosim, loci, causæ signorumque tumoris certa cognitio sufficit. Primus datur certitudinis gradus, si tumor aperturis §. IV, §. V, descriptis,

(1) Platner, pag. 505, art. 794.

respondeat;

respondeat; secundus, si ab allatis §. XI, §. XII, causis, proveniat; denique tertius, si ad signa attendatur, quorum alia sunt intestino, alia omento propria.

Hernia intestinalis tumorem aequalem, circumscriptum, plus minusve durum, digitorumque tactui renitentem exhibet; qui, si simplex, ægro supino, faciliè versùs interiora, sponte vel taxi, quodam cum murmure, repellitur. Ubi omentalis, tumor animadvertitur mollis, inæqualis, doloris expers, intrà abdomen sine murmure descendens.

§. X V.

Herniarum simplicium prognosis.

QUEMADMODUM certum de quolibet morbo iudicium medentem decet; sic etiam nihil arduum magis quàm in Herniis, licèt simplicioribus, rectam elicere prognosim. Cave ne, vanâ speculationis allucinatus, temerè promittas! Desperandum enim, si Hernia causas disponentes §. XI agnoscat, à longo tempore existat, facilièque retrocedat; si locus tegumentis laxioribus operiatur, ibique parùm cellularis textus occurrat; si nimium distendantur aperturæ, ac tandem æger si quodam adversante afficiatur morbo, ut atoniâ adæmate tussi, &c.

Ramex è contrà, præsertim intestinalis, determinantibus causis §. XII si producat, recens sit, difficilisque reductionis, æger aliàs floridâ, validâque sanitate fruatur, aut nunc debilis mox se refarciri promittat; partibus in abdomine repositis, si inguen tensum, levi rubro colore donatum, non omni sensu doloris expers remaneat; renixu naturali aperturæ gaudeant oræ; tunc, curatio radicalis speranda.

§. X V I.

Ad certiorē prognosim quædam de sacculo Hernioso adnotanda supersunt. Irrumpentes internas partes, ut suprà diximus, concomitatur & cingit peritonæum, sicque sacculum efformat; qui eò crassior fit, quò morbus antiquior. Duplicem habet faciem; unam interiorem, levigatam, roreque indefinenter illinitam, quæ partes prolapsas ambit; alteram externam, cellulosam, vicinis partibus plerùmque adnexam.

§. X V I I.

NONNULLI Auctores celeberrimi, imò observationibus fulti, de sacculi adhæsione, partibus adjacentibus, diversimodè sentiunt. Alii contendunt illam non semper existere. Tales sunt Saviard (1), Ledran (2), La Faye (3), Petit (4), Arn... (5),

(1) Obs. XIX.

(2) Obs. LVIII.

(3) Not. in Dionis, pag. 324, edit. IV.

(4) Œuv. Posth. tom. pag. 338. La portion du péritoine, qui forme le sac, est rentré dans le ventre, & a repris son niveau avec le reste du péritoine.

(5) Trait. des Hern. tom. II, pag. 34 & seq. 58. & in appendice operis cui titul. *Mém. de Chirurg. in-4. tom. II, pag. 453.*

Mauchart (1), Mat. Georg. Pfan (2) ; qui asseruerunt sacculum ab aperturis § III. perfectè liberum & reductum, partes prolapsas adhuc continentem, aut ipsis agglutinatum pluriès invenisse.

Hancce sacculi sejunctionem, jam pluribus abhinc annis, nos ipsi agnovimus, cadaveris sectione, quam dilucidè perfecit meritisissimus Magister l'Héritier.

Sacculi collum, gallicè *collet*, unicum sapissimè rarè duplex reperitur. Si duobus locis contrahitur sacculus, suam lagenæ figuram in cucurbitinam mutat (3) & novum de suâ libertate subministrat argumentum.

Contrarium viderunt ; aut potius nunquam huncce sacculi statum perceperunt, plures celeberrimi Auctores inter quos eminent D. Louis (4), Pott (5).

(1) In Diss. de Her. incarcer. inter disp. Chirurg. ab Hall. ed. t. III, pag. 86. Item, præsentè suprà laudato D^{no} Thibault, cum bubonocèles operationi in Collegio nostro se offerret cadaver Herniosi, operationem ego perfecti, separatoque sacco interno vasa spermatica, aliâ adhuc membranâ recta, vidimus. Undè similis conclusio..... 91. In cavum abdominis cum sacco, *integro reposito*, redundet..... Saccus hicce antè foramen annuli in posterum fluctuans, nec pristinum facillè accipiens tonum ex longâ dilatactione..... 92. Repositus (sacculus) in cavum abdominis non desistit à constitutione periculosâ.

(2) In Diss. de enterè oscheocele antiquâ sacci Herniosi restitutione, ejus. tom. pag. 121..... Intestina simul cum involucre suo, saccum intelligo, in abdominis cavitatem retropulsa sunt.....

(3) Arn.... Trait. des Her. tom. II. pag. 90.

(4) Mem. Acad. Reg. Chirurg. vol. IV. Réflex. sur la Hern..... J'ai ouvert un assez grand nombre de cadavres de personnes qui avoient été sujettes à Hernies, même de celles qui avoient été guéries radicalement en portant un bandage : on trouve à toutes le sac herniaire, ou la production du péritoine adhérente naturellement aux parties qui l'environnent.

(5) Je n'ai jamais rien vu, soit dans le cadavre, soit dans le vivant,

Celeber. Gunzius de sacculi Herniosi reductione sic alloquitur in Libell. jam citato : *Saccus , nisi vel recentissimum malum sit , ve. sectione habitâ restitui non potest..... Saccus , si recens Hernia , raro , si antiqua , nunquam restituitur.*

Ex istâ decertatione , quid ad mentem nostram ? Cùm illa perrara (1) sacculi separatio , vel ipsius adhæsiō ad absolutam Herniæ simplicis curationem nullius sit momenti , nisi in methodo Celeb. nostri Petiti , §. XX. Constat enim innumeris observationibus (2) , curationem *radicalem* nihilominus obtineri ; licet fiat , vel non , sacculi reductio.

§. XVIII.

C U R A T I O.

Ad perfectam Herniarum simplicium curationem quæ sunt naturæ relinquenda , quæ arte tentanda , secernere æquè necessarium , æquè arduum est. *Experientia fallax.* Remediorum jactatoribus nimium ne confidas. Hic inveteratæ Herniæ , causâ molis incurabiles judicatæ , nihilominus casu fortuito (3) aut arte peritâ (4) evanescere. Ibi recentes ac parvæ conatibus artis legitimâ administratione adhibitis , resistere videntur. Tantis è tenebris verum accipere summus labor.

qui puisse faire supposer que cette réduction soit possible. *Œuv. Chirurg.* tom. I. in-4^o. pag. 383.

(1) Arn.... *Mém. Chirurg.* in-4^o. pag. 8. appendicis.

(2) Ambroise Paré Lib. VIII, cap. V. Ledran , *Obs.* tom. II , p. 16.

D. Louis , loco jam citato.

(3) Quod Clarissimus Præses & ego compertum habemus.

(4) Arn.... *Trait. des Hern.* tom. II , pag. 128 & seq.

§. X I X.

CURATIONI absolutæ obtinendæ, totam impendat artem suam Chirurgus, ut causæ disponentes §. XI, determinantefque §. XII aut mutantur aut vitentur, & locale vitium §. XI, deleatur. Indè pro vario casu varia instituenda curandi norma (1). Pravam corporis habitudinem, in meliorem reducat. Fluidis solidisque attendat, ipsisque diætâ ritè ordinatâ, idoneisque remediis subveniat: functiones læsas, aut restituat aut expeditiores reddat: exercitium regat, aut præhibeat: ægrum supinatum, pro re natâ, cubare jubeat (2). Uno verbo, diversa sūt medela pro morbi differentiâ.

§. X X.

LONGÈ distant à scopo qui, ab istis alieni regulis, unicè solliciti de nimium patentibus aperturis §. III, atque de peritonæi productione, conantur illas constringere vel obturare aut facculum destruere, mediante sectione, excisione, cauterisatione, futurâ, ligaturâ cerato filo aut aureo, unde *punctum auratum*, peractâ, causticis (3) & etiam castratione; sed heu! Nihilominus fiet morbi reditus. Nil valet, nil prodest igitur viæ Hernialis obductio cicatrice producta, & nunquàm sine peri-

(1) Arn.... Trait. des Hern. tom. I, chap. XIV, pag. 115.

(2) Multi sunt qui cubitu supino sanati fuerunt, etiam citra aliorum remediorum usum Avenzoar 24. Thes.... Hildan. cent. 6. Obs. 70.

(3) Quid de causticis censendum scitè consultèque statuerunt clarissimi Magist. Bordenave, in Actis Acad. Chirurg. & Magist. Auvity in sua Thesi de periculo causticorum in Herniis curandis.

culo imminente tentata fuit (1). Indè perspicuè videmus quid expectandum sit de sequentibus methodis, quarum, prima celeb. nostri Petiti, in quâ sacculus in acervum collectus apertura inferitur, ibique agglutinatur: secunda Dom. le Blanc (2), quâ sacculus inciditur, vitatis apertura oris: tertiâ demùm D. Ant. Petiti, celeb. Med. Paris. in suâ Thes. proposita: *an plumbeâ lamellâ sub cutim novâ arte insinuatâ rectius, tutiusque quàm alio quovis artificio contineantur in sede partes, quæ prolapsu suo Hernias facere solent?*

§. X X I.

TRIA sunt exteriùs agenda; 1°. partes sublevandæ debiliores, ne pondere viscerum graviùs opprimantur; vis reprimenda abdominalium muscutorum, qui, dùm agant, oras apertura se invicem distrahunt: hîc apprimè prosunt fabrefactæ fasciæ ventrales, gallicè *ventrières*, quæ ventrem sustinendo muscutorum actioni favent; 2°. partes dilabentes retinendæ sunt mediante Brasherio, artificiosè, methodicèque constructo; 3°. demùm corroborantibus topicis firmandæ; & certè uberior est illorum familia, in quâ, pro mente suâ, eligat quisque; omnia enim recensere quid opus? Si quis tamen voluerit, pervolvat opera Hollerii, Paræi, Sennerti, Sculteti, Fonseca, Dionisii, Arnoldi, &c. Aliundè nemo inter peritissimos

(1) Arn., Mém. de Chirurg. in-4, tom. II, pag. 453, 455 & 461.... Petit, Œuv. posth. tom. II, pag. 354 & seq.... Je ne suis point le seul qui ait observé que les opérations faites aux Hernies, sans étranglement, n'ont point de suites si heureuses que celles qui sont faites aux Hernies étranglées.....

(2) Précis d'opérat. Chirurg. tom. II, pag. 174.

Chirurgos ignorat è triplici fonte animali, scilicet, vegetabili mineralique regno remedia haurienda, & legibus tum Pharmaciae, tum Chymiae, habitâ etiam ratione nostrarum partium, componenda. Non desunt leporina ursinaque axungia, ovorum albumina, lacertæ, formicæ majusculæ; Herniaria, pilosella lutea, symphitum majus, sigillum Salomonis, tormentillæ, nuces cupressi, coriarius pulvis, pix, resina pini, sal gemmæ, vitriolum, alumen, minerales aquæ meraque aqua gelida: in officinis etiam sunt emplastrum contra rupturam, spiritus acidi & ardentes, vinum aromaticum, aqua rabelliana, &c. quæ languentes partes corroborare valent.

Sciscitanti nûm ita sanatus bracherio deinceps indigeat? Responderemus affirmativè: qualiscumque sit enim partium status post sanationem, non firmior est quàm antè morbi generationem, ac proinde Hernia nihilominus revertere potest; idcirco leve bracherium sicuti, prophylacticum, adhibendum est.

F I N I S.

*HANC Dissertationem, Deo juvante & Præsidi M. CLAUDIO-
FRANCISCO GARRE, Collegii Chirurgorum Parisiensium
Magistro, Academiæ Regiæ Chirurgiæ Consiliario, Saluberrimæ
Facultatis Medicinæ Remensis Doctore, Scientiarum & Artium
Academiæ Andegavensis Socio, Regiæ Scholæ Militaris Chirurgo
primario, Majoris Equilis, necnon nobilium regis Epheborum
Chirurgo ordinario, tueri conabitur JOANNES - PETRUS
LE ROUGE Parisinus, præclara Artium Facultatis in*

*almâ Universitate Parisiensi Magister, in Remensi Doctor
Medicus, nuper Magni Nosocomii Parisiensis Chirurgus
internus, & Regalis Armenti Medicus ordinarius, Dis-
sertationis Auctor.*

*Die Sabbati 27 mensis Augusti, anno R. S. H. 1783, à
sesqui-secundâ post meridiem ad septimam,*

**PARISIIS,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.**

PRO ACTU PUBLICO,

ET

MAGISTERII LAUREA.



**Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ
Collegii, necnon Academiæ Typographi, viâ Cythareâ.**

M. DCC. LXXXV.